


تڻ يا اوھ جي سوچ کان بچاءُ

تڻ جي سوچ کي گھڻو ڪري اوھ جي سوچ يا فڪريو چيو ويندو آھي.



تڻ جي سوچ ۾ مبتلا جانورن جي کير جي معيار ۽ مقدار ۾ تمام گھڻي گھٽتائي اچي ويندي آھي ۽ بروقت علاج نہ ٿيڻ جي صورت ۾ تڻ ضايع ٿي ويندو آھي جيڪو ڊيري فارمر جي معاشي نقصان جو سبب بڻجي ٿو.

تڻ جي سوچ ٿيڻ جا اھم سبب



- واڙي ۾ صاف سترائي جو غير مناسب انتظام. • تڻ يا اوھ تي ۽ ان جي علاج تي توجہ نہ ڏيڻ.
- خراب ھٿن ۽ غلط طريقي سان ڏوھائي ڪرڻ. • قرن کي ڏوھائي کان پوءِ کير پيارڻ.
- پھچوندي لڳي خوراڪ کا استعمال ڪرڻا • سينور (فنگس) لڳل خوراڪ جو استعمال ڪرڻ.

تڻ جي سوچ جون نشانيون (ظاهري حالت ۾)



- اوھ ۾ اوچتو سوچ، ڳاڙھو ٿي وڃڻ، ھٿ لائڻ تي گرم ۽ جانور کي سور محسوس ٿيندو آھي.
- جانور کي تيز بخار ٿي ويندو آھي ۽ جانور کائڻ پيئڻ ڇڏي ڏيندو آھي.
- کير جي پيداوار ۾ گھٽتائي، کير جو ڦٽي وڃڻ ۽ کير ۾ ڳنڍا نظر اچن ٿا.
- تڻ جي سوچ واري جانور جو کير بدبودار ۽ لوڻيائو ٿي وڃي ٿو.
- بروقت علاج نہ ڪرائڻ جي صورت ۾ تڻ جي اندر ناڙ (مٿيون) ٿي ويندو آھي جنھن جي ڪري ھڪ يا ھڪ کان وڌيڪ تڻ سڪي ويندا آھن.

تڻ جي سوچ جون نشانيون (اندروني يا لڪيل حالت ۾)

- تڻ يا اوھ جي ظاهري بناوت ۾ ڪا بہ تبديلي نظر نٿي اچي.
- جانور صحتمند نظر ايندو آھي پر کير جي پيداوار ۾ ڪوت ۽ کير لاهڻ ۾ دير ڪندو آھي.
- کير ۾ ڦٽيون موجود نہ ھونديون آھن پر کير جو ذائقو لوڻيائو ٿي ويندو آھي.
- اھڙي حالت ۾ تڻ ۾ ناڙ (مٿيون) ٿي ويندو آھي ۽ اھو سلسلو گھڻن مھينن يا سالن تائين لڪيل رھي سگھي ٿو.
- ڪڏھن ڪڏھن تڻ مان ڇڏي لسي يا گند جھڙو گھاٽو مواد نڪرندو رھندو آھي.

سرف ٽيسٽ جو طريقو



ٽٽن جي سوچ جي اندروني حالت ڏسڻ جي لاءِ سرف ٽيسٽ سڀ کان سادو ۽ سستو طريقو آهي.

جانورن ۾ ٽٽن جي سوچ جي سڃاڻپ جي لاءِ هر پندرهن ڏينهن بعد سرف ٽيسٽ ضرور ڪريو.

گهر ۾ عام استعمال ٿيندڙ سرف جا 2 کان 3 چمچ هڪ ڪوپ ۾ حل ڪريو.

چار پيالون کڻي ان ۾ چارئي ٽٽن مان ڌار ڌار کير جا گوها (سيٽهون) وٺو.

هڪجيتري مقدار ۾ سرف وارو پاڻي ان چارئي پيالن ۾ وجهي اڌ منت تائين هلائيندا رهو.



جيڪڏهن کير ۾ ننڍيون ننڍيون ڦٽيون هجن بيماري جو پهريون درجو (+)

جيڪڏهن کير گهاٽو يا سفيد ريشيدار هجي. بيماري جو ٻيون درجو (++)

جيڪڏهن کير جيلي وانگر گهاٽو هجي. بيماري جو ٽيون درجو (+++)

جيڪڏهن کير چٻو ۽ پنهنجي اصل شڪل ۾ هجي جانور بيماري کان محفوظ آهي

ٽٽن جي سوچ کان بچاءُ جا اهم اپاءَ



ٽٽن جي سوچ کان بچاءُ جي لاءِ ڏينهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻه دفعه وڙي جي صفائي ضرور ڪريو ۽ کير جي لاءِ استعمال ٿيندڙ ٽائون جي صفائي جو خاص خيال رکيو.

کير جي ڏوهائي کان پهريان ۽ پوءِ ٽٽن ۽ اوهه کي چڱي طرح ڌوئي خشڪ ڪري وٺو.

ڪڏهن به آنگوٺو بند ڪري ڏوهائي نه ڪريو ۽ کير جي مڪمل ڏوهائي ڪريو.

قرن کي ڏوهائي کان پهريان کير پياريو.

ڏوهائي کان پوءِ ٽٽن کي جيوڙن کان بچاءُ واري دوا لڳائڻ سان ٽٽن جي سوچ واري بيماري ۾ گهٽتائي آڻي سگهجي ٿي.

کير جي ڏوهائي کان پوءِ جانورن کي گهٽ ۾ گهٽ اڌ ڪلاڪ ويهڻ نه ڏيو ته جيئن ٽٽن ۾ کير واري نالي بند ٿي وڃي.

بيماري واري جانور کي صحتمند جانورن کان الڳ رکيو ۽ ان جي ڏوهائي آخر ۾ ڪريو.

ڏکي جانور کي خشڪ ڪرڻ کان پهريان گهڻي وقت تائين اثر رکندڙ اينٽي بايوٽڪ ٽٽن ۾ داخل ڪريو اهڙي عمل سان ويامن بعد ٽٽن يا اوهه جي سوچ جو خطرو گهٽجي وڃي ٿو.

ٽٽن يا اوهه جي سوچ ۽ ٻين جرايمي بيمارين جي خلاف مناسب قوت مدافعت جي لاءِ جانورن کي متوازن خوراڪ ڏجي.

جانورن جي صحت جي متعلق ماهر ويٽرنري ڊاڪٽر سان فوري رابطو ڪريو.

اي ايس ايل پي، ڊيري پراجيڪٽ يونيورسٽي آف ويٽرنري اينڊ اينيمل سائنسز، لاهور.

فون: 042-37212339 ويب سائٽ: www.aslpdairy.pk