

هر سال ڦرجو وٺڻ

وهر جي سڃاڻپ صبح شام
باقائدي سان ڪريو



جانور کان هر سال ڦروٽڻ ڏيڻي
فارم جي خوشحالي
جي ضمانت آهي



هٿرادو نسل ڪشي وهر جي
پهرين علامت ظاهر ٿيڻ کان پوءِ 24
ڪلاڪن کان پوءِ ڪرايو



سٺي نسل ۽ بهتر پيداواري صلاحيت
واري سان گڏجي چونڊ ڪريو



ڍڪي نه هجڻ جي صورت ۾
ڪنٽرول بريدنگ جي حڪمت
عملي جو انتخاب ڪريو



نسل ڪشي کان پوءِ 60 ڏينهن ۾ ڍڪي
ٿيڻ جي سڃاڻپ ضرور ڪرايو



فائديمند ڊيري فارمنگ جي لاءِ سڀني
ڪم ڪارن جو ريڪارڊ رکڻ ضروري آهي.



نسل وڌائڻ جي ڪمن جو ريڪارڊ

| نسل وڌائڻ جي ڪمن جو ريڪارڊ | ڊيري فارمنگ | | نسل وڌائڻ | | ڊيري فارمنگ | | نسل وڌائڻ جي ڪمن جو ريڪارڊ |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| | ڊيري فارمنگ | نسل وڌائڻ | ڊيري فارمنگ | نسل وڌائڻ | ڊيري فارمنگ | نسل وڌائڻ | |
| ڊيري فارمنگ | ڊيري فارمنگ | ڊيري فارمنگ | ڊيري فارمنگ | ڊيري فارمنگ | ڊيري فارمنگ | ڊيري فارمنگ | ڊيري فارمنگ |
| نسل وڌائڻ | نسل وڌائڻ | نسل وڌائڻ | نسل وڌائڻ | نسل وڌائڻ | نسل وڌائڻ | نسل وڌائڻ | نسل وڌائڻ |

اي ايس ايل پي، ڊيري پراجيڪٽ



يونيورسٽي آف ويٽرنري اينڊ اينيمل سائنسنس، لاهور

فون: 042-37212339

ويب سائٽ: www.aslpdairy.pk



ڍڪڻ جون پڇيڊتايون نه صرف جانورن جي پيداواري صلاحيت کي متاثر ڪن ٿيون پر علاج ۾ لاپرواهي ڪرڻ سان جانور هميشه جي لاءِ سنبهه جو شڪار به ٿي سگهي ٿو جيڪو ڊيري فارمر جي لاءِ هڪ وڏي معاشي نقصان جو سبب ٿي سگهي ٿو.



آس يا پڇو ڪڍڻ

غير متوازن خوراڪ، نمڪيات جي گهٽتائي، هارمونز جو توازن برابر نه هجڻ، جسماني بناوت، موروثي ۽ جانورن جي رهائش جو غير مناسب انتظام آس نڪرڻ جا اهم سبب آهن.

ظابطي لاءِ اهم مشورا

- جانورن کي هميشه متوازن خوراڪ ڏيو ۽ رهائش جي بنيادي اصولن کي مدنظر رکو.
- جيڪڏهن ممڪن ٿي سگهي ته انهي بيماري ۾ مبتلا جانورن کي وڪرو ڪري ان جي جڳهه تي سٺي نسل جو جانور خريد ڪريو ڇو ته انهي بيماري جو اچڻ واري نسل ۾ منتقل ٿيڻ جا امڪان وڌيڪ هوندا آهن.
- متاثر جانور يا انهي بيماري جي شڪ واري جانور کي چڪي چاڙهي ڇڏيو.
- نا تجربڪار ڊاڪٽرن کان آس جو علاج نه ڪرايو پر جلدي ۾ پنهنجي قريبي ويٽرنري ڊاڪٽر سان رابطو ڪريو.



ڄر جو نه نڪرڻ

عام طور تي جانور ڄر جي پيدائش جي 6 کان 8 ڪلاڪن جي اندر ڄر مڪمل طور تي ڪرائي ڇڏڻ گهرجي. بروقت علاج نه ٿيڻ جي صورت ۾ جانور کير جي گهٽتائي، بخار، رحم جي سوڄ ۽ سنبهه جو شڪار به ٿي سگهي ٿو.

ظابطي لاءِ اهم مشورا

- ڄر جي پيدائش جي فورن بعد جانور جو کير ڏوهي ڇڏيو ڇو ته اهو عمل جانورن جي جلد ڄر ڪرائڻ ۾ فائديمند آهي.
- جانور کي هميشه متوازن خوراڪ ڏيو ۽ نمڪياتي آميزي جو استعمال ضرور ڪرايو.
- ڄر نه نڪرڻ جي صورت ۾ پنهنجي ماهر ويٽرنري ڊاڪٽر سان رابطو ڪريو.



جانور جو وري وري نه ڦرجڻ

متاثر جانور وهر جي علامت ته باقائدي سان ظاهر ڪندو آهي مگر نسل ڪشي ڪرائڻ کان پوءِ به ڍڪو نه ٿي سگهندو آهي جيڪو ڊيري فارم جي لاءِ هڪ اضافي نقصان جو سبب بڻجي ٿو جانور جو وري وري نه ڦرجڻ جا گهڻائي سبب آهن پر جن مان ڪجهه هيٺ ڏجن ٿيون:

- متوازن خوراڪ ۽ نمڪيات جي گهٽتائي
- وهر جي سڃاڻپ کان پوءِ به غلط وقت تي نسل ڪشي ڪرڻ
- شديد موسمي اثرات
- غیر معياري يا مثل سيمين (بچ) جو استعمال ڪرڻ
- ناتجربڪار ٽيڪنيشن کان هٿرادو نسل ڪشي ڪرائڻ
- مختلف جراثيمي بيمارين جا خراب اثر
- مختلف جراثيمي بيمارين جا خراب اثر
- ڍڪڻ مرضن جون پيچيدگيون جيئن رحم جي سوچ يا پس جو ٿي وڃڻ
- ڪير لاهڻ وارن ٽڪن جو استعمال ڪرڻ

ضابطي لاءِ اهم مشورا

- جانورن کي متوازن خوراڪ ۽ نمڪياتي آميزي جو استعمال ضرور ڪرايو
- افزائش نسل جي ڪمن جو رڪارڊ رکڻ سان جانور جي وري وري نه ڦرجڻ جي مخصوص سببن کي ڄاڻڻ ۾ مدد ملي ٿي
- ماهر ٽيڪنيشن جي مدد سان جانور جي نسل ڪشي موزون وقت تي ڪرايو
- متعلقه ذريعن کان معياري سيمين (بچ) جو انتخاب ڪريو
- ماهر ويٽرنري ڊاڪٽر جي مشوري کان سواءِ رحم ۾ دوائن جو غير ضروري استعمال کان پرهيز ڪريو

غير منافع بخش جانورن جو نيڪال

ڪامياب ڊيري فارمنگ جي لاءِ غير منافع بخش جانورن

ڪاش! انهي ناڪارا جانور جي بروقت نيڪالي ڪري آئون معاشي نقصان کان بچي سگهان...



جو واڙي مان نيڪال انتهائي ضروري آهي. هيٺ ڏنل سببن جي بنياد تي جانورن جو نيڪال هجڻ گهرجي

- موروثي نقص جيئن آس ڪڍڻ وارا جانور
- انتهائي گهٽ پيداواري صلاحيت جا حامل جانور
- دائمي بيمارين ۾ مبتلا جانور جيئن تي. بي
- وڏي عمر وارا جانور
- ظاهري نقصن وارا جانور
- گهٽ وهر ۾ اچڻ وارا جانور
- تڻن جي مرضن ۾ مبتلا جانور

اي ايس ايل پي، ڊيري پراجيڪٽ يونيورسٽي آف ويٽرنري اينڊ اينيمل سائنسز، لاهور

فون: 042-37212339 ويب سائٽ: www.aslpdairy.pk