



## ٽنڊڄڻ / ڪچا ڦر ڪيرائڻ (Brucellosis)

Aik Saath

ايڪ ساٿھ

'Together'

### تعارف

ٽنڊڄڻ/ ڪچا ڦر ڪيرائڻ هڪ اهم بيماري آهي جيڪا پڪرين ۽ رين جي پڇيءَ داني جي سرشتي کي بند ڪري يا بيهاري، انهن جي پيداوار ۾ وڏي اقتصادي نقصان جو سبب بڻجي سگهي ٿي. هي هڪ زونوسس (Zoonosis) بيماري آهي جيڪا جانورن ذريعي انسانن ۾ منتقل ٿي سگهي ٿي.

### ٽنڊڄڻ/ ڪچا ڦر ڪيرائڻ جا سبب ڇا آهن؟



هي هڪ وچرنڌڙ مرض آهي جيڪو سنهڙن جيوڙون (جراثيم) بروسيليا جي ڪري ٿيندي آهي. جنهن جا قسم هيٺ ڏجن ٿا.

- بروسيليا ميلاتينسس (*Brucella melitensis*) جيڪا عام طور تي پڪرين، رين ۽ اٺن ۾ بيماري پندا ڪن ٿا.
- بروسيليا اووس (*Brucella ovis*) ريڍ ۾ پڇو پندا ڪرڻ جي صلاحيت کي ختم ڪري ٿي، هي جيوڙا انسان ۽ ٻين جانورن کي متاثر نه ٿا ڪن.
- بروسيليا ايبارٽس (*Brucella abortus*) ڍڳين کي نقصان پهچائيندو آهي پر پڪرين ۽ رين کي تمام گهٽ متاثر ڪري ٿو.

### بروسيلاسس جون بيماري جانورن ۾ ڪهڙيون نشانيون ظاهر ٿين ٿيون؟



- نئي بيمار ٿيل ڌڻ ۾ دير سان حمل ٿيڻ جي ڪري ڦر چنڊجي وڃڻ عام نشاني آهي. ڦر جو دير سان ڄمڻ، ڪمزور ڄاول ڦر، ڄر جو نڪري اچڻ يا ڪري پوڻ، اوهه يا ٿڻن جي بيماري مادي جانورن جون نشانيون آهن.
- بروسيلاسس جانور ۾ هميشه لاءِ سنڀيڻي جو سبب بڻجي سگهي ٿو. ريڍ ۽ پڪري جي نر جانورن ۾ خصيا يا انورا سڄي پوندا آهن. ڪڏهن ڪڏهن متاثر جانورن جي هڏن ۾ سوڄ ٿي پوندي آهي.



- ريڍ ۽ پڪري عام طور تي صرف هڪ ڀيرو ڦر چنڊينديون آهن پر هن بيڪٽيريا جي ڪري باربار چنڊينديون آهن انهيءَ جي لاءِ بغير ڪا نشاني ظاهر ڪرڻ جي بيڪٽيريا ٻين جانورن ۽ انسانن کي متاثر ڪري سگهن ٿا. اهو به ٿي سگهي ٿو ته جانورن جي ڌڻ ۾ ڪجهه عرصي لاءِ ڪا به علامت ظاهر نه ٿئي پر پوءِ به ڪو جانور ڦر چنڊي سگهي ٿو.
- پڪريون مسلسل طور تي انفڪشن جو شڪار ٿي سگهن ٿيون ۽ انهن جي کير ۾ بيڪٽيريا جي موجودگي به ٿي سگهي ٿي. صحتمند ۽ بيماري جي بغير علامت وارو جانور ٻين جانورن ۾ بيماري جو سبب بڻجي سگهن ٿا.

### بروسيلاسس جون ڪهڙيون نشانيون انسانن ۾ ظاهر ٿينديون آهن؟

شروعاتي علامتن ۾ زڪام ٿيندو آهي جنهن ۾ تيز بخار، مٿي ۾ سور، جسم ۾ ڪمزوري، هڏن ۾ سور، وزن ۾ گهٽتائي ۽ بڪ نه لڳڻ شامل آهن. حاملن عورتن ۽ ٻارن ۾ هن بيماري جي ڦهلجڻ جو خطرو گهڻو هوندو آهي. اگر علاج جلدي نه ڪرايو ويو ته ٻار ۾ پنداشي نقص يا ڦر جي چنڊجڻ جهڙا نقصان ٿي سگهن ٿا.

### جانورن ۾ ٽنڊڄڻ واري بيماري (بروسيلاسس) ڪيئن ٿيندي آهي؟



- بروسيلاسس جو جانورن ۾ ڦهلجڻ جو سبب بيمار جانورن جي ڄر يا اوزر، ڳڳ، ڳڳ جو پاڻي ۽ پڇيڏائي مان نڪرندڙ نيڪال کي چهڻ يا رابطي ۾ اچڻ سان ٿئي ٿي.
- اها بيماري کير ۽ مٺي جي ذريعي به ڦهلجندي آهي، تنهنڪري هڪ دفعو بيماري ڌڻ ۾ اچڻ کانپوءِ جانورن ۾ وچڙندي رهندي آهي.
- بروسيليا مٽي، سامان، ڪپڙن ۽ ڪڪ جي بستري تي متاثر ٿيل سامان سان رابطي ۾ اچڻ جي ڪري گهڻي وقت تائين زندهه رهي ٿو.

- سج جي سڌي روشنيءَ وڌيڪ عرصي تائين لڳڻ جي ڪري بروسيلاس جراثيم کي ماري ڇڏيندي آهي.

### بروسيلاسس جي تشخيص ڪيئن ڪئي ويندي آهي؟

- جڏهن حامل جانور ڪچو ڦر چنڊي ڏي ته انهي بيماري کي بروسيلاسس سمجهڻ گهرجي ۽ جلد کان جلد احتيائي اپاءَ وٺڻ گهرجن ته جيئن انسانن ۾ نه ڦهلجي سگهي.
- يقيني تشخيص صرف ليباريٽري ٽيسٽ سان ڪري سگهجي ٿي. خاص معاملن / ڪيسن ۾ ڪير ۽ تنبجڻ واري مواد کي ليباريٽري ۾ چڪاس ڪري سگهجي ٿو.
- بيماري هجڻ جي شڪ جي سڃي ڏن جي مڪمل چڪاس ڪري سگهجي ٿي.

### جانورن ۾ بروسيلاسس بيماري جي شڪ هجڻ جي ڪري ڇا ڪرڻ گهرجي؟

- بيماري مان متاثر جانور، متاثر سامان يا مادي جانور مان ڦر ڪيڏن جي دوران هميشه حفاظتي لباس پائڻ گهرجي. مرض کان بچاءَ لاءِ صفائي ضروري آهي.
- جيڪڏهن جانورن ۾ بيماري جو شڪ هجي ته بيماري جي تشخيص ۽ صلاح وٺڻ لاءِ ڀاڱيو سرڪاري جانورن واري شعبي يا ڊاڪٽر سان رابطو ڪري سگهجي ٿو.

### علاج

- بيماري جو ڪوبه عملي علاج موجود نه آهي، توليدي سرشتي جي ڪمزور ڪارڪردگي ڀاڱين کي وڏو معاشي نقصان رسائي سگهي ٿو. تنهنڪري ضابطو ۽ بچاءَ تمام ضروري آهي.
- بروسيلاس ميلائيٽينس (Brucella melitensis Rev 1 strain) سڀني کان بهترين ملنڊز ويڪسين آهي، جيڪا بروسيلاسس بيماري کي روڪڻ لاءِ ڀرين ۽ پڪرين کي اڳواٽ لڳائي آهي.



### وچرنڊڙ مرض تي ضابطو / صفائيءَ

- جانورن جي ڏن ۽ انسانن جي بچاءَ لاءِ صفائي رکن تمام ضروري آهي.
- مرض مان متاثر ٿيل سامان يا ڦر جي پنڊا ٿيڻ وقت هٿ وجهڻ محل ڪپڙن کي ڍڪجي، مضبوط ربر يا پلاسٽڪ جا دستانا پانجن ۽ ڪم ختم ٿيڻ کانپوءِ صابن ۽ پاڻي سان سٺي نموني صفائي ڪرڻ گهرجي.
- متاثر ٿيل يا رابطي ۾ ايندڙ ڪپڙن، سامان ۽ جڳهه کي صاف ۽ جراثيمن کان پاڪ رکن گهرجي.
- متاثر ٿيل مواد کي گهرو ڪڏو کوٽي دفن ڪرڻ گهرجي.
- بيماري جي ڦهلاءَ کي روڪڻ لاءِ بيمار جانورن کي باقي جانورن کان پري رکن گهرجي.
- ڪچو ڪير يا گوشت واپرائڻ ماڻهن ۾ مرض ڦهلجڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
- ڪير پيئڻ يا دهلي، پيئڻ، مڪڻ کان پهرين ڪير کي سٺي طرح ٽهڪائجي ۽ گوشت کي به سٺي نموني پچائڻ گهرجي.
- حامل عورتن کي اهڙن جانورن جنهن ۾ بروسيلاسس بيماري هجي يا ٿيڻ جو امڪان هجي کي سنڀالڻ نه گهرجي.

### بچاءَ يا احتيائي اپاءَ

- احتيائي اپاءَ بروسيلاسس جي ڦهلجڻ کي محدود ۽ قابو ڪرڻ لاءِ ضروري آهن.
- بچاءَ وارا طريقا استعمال ڪرڻ وڏي اهميت رکن ٿا (خاص طور تي مقامي علائقن ۾ جتي بروسيلاسس عام آهي) هن بيماري جي ڦهلاءَ کي گهٽ ڪرڻ جي لاءِ احتياط ڪرڻ تمام ضروري آهي.
- مناسب حفاظتي ۽ صحتي ضابطا صحتمند جانورن جي ڏن ۾ بيماري جي ڦهلجڻ ۾ گهٽائي جي لاءِ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا.
- وقتي طور تي تشخيصي ڇاڇ پڙتال ڪرڻ سان مرض تي ضابطو آڻي سگهجي ٿو.
- معاشي ۽ صفائي واري نقصان کان بچڻ لاءِ ويڪسينيشن بروسيلاسس کان بچڻ لاءِ بهترين طريقو آهي.

