


پچش



1

فضلہ نرم ہو جاتا ہے۔

2

فضلہ پتلا، پانی کی طرح یا لیس دار
رطوبت کی طرح ہو جاتا ہے

3

شدید پچش کی صورت میں
فضلہ خونی بھی ہو جاتا ہے۔

علامات

اگر چہ سرسبز چارہ کھانے سے بھی فضلہ عموماً نرم ہو جاتا ہے۔
لیکن پچش کی صورت میں یہ علامات دیکھی جاسکتی ہیں۔



- وزن میں کمی
- بھوک میں کمی
- سستی اور دباؤ کی کیفیت
- بخار

وجوہات



● ** طفیلی کیڑوں کی وجہ سے انفیکشن



● جراثیموں کی وجہ سے انفیکشن*



خوراک کے معمول میں اچانک تبدیلی
بشمول سرسبز شاہاد چارہ یا نشاستہ دار خوراک
جیسا کہ گندم اور جو کا ایک دم اضافہ کر دینا۔



کچھ پودے کھانے کی وجہ سے
پچش لاحق ہو سکتی ہے۔

بچاؤ


پچش زدہ بھیڑ اور بکریوں کو باقی ریوڑ سے علیحدہ رکھیں۔
بیمار میمنوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ علیحدہ رکھیں۔

ماحول اور باڑوں کو صاف ستھرا رکھیں۔

بیمار جانوروں کی دیکھ بال اور علاج
کے بعد ہاتھ پاؤں اور جوتوں کو
اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔



دھیرے دھیرے ہفتہ بھر میں اسے نئی
خوراک متعارف کروائیں۔ نشاستہ دار
خوراک جیسا کہ گندم بعد میں
متعارف کروائیں۔



اچھی قوت مدافعت کیلئے نوازنیہ میمنے کو
کولو سٹرم (بولی) پلائیں

** طفیلی: ایسے جراثیم کیڑے وغیرہ جو اپنی خوراک اور بقاء کیلئے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔

* انفیکشن: متعدی وبائی مرض جو جراثیموں، طفیلی کیڑوں وغیرہ سے پھیلے

پچش معدہ اور آنتوں کی ایک عام بیماری ہے جس کا شکار ہر عمر کی بھیڑ اور بکری ہو سکتی ہے۔

اس بیماری میں بھیڑ اور بکریوں کا فضلہ نرم، پانی کی طرح پتلا، لیس دار رطوبت زدہ اور شدید حالات میں خونئی بھی ہو سکتا ہے۔



ماس مکھی (بلوفلانی) کے حملہ سے بچاؤ کیلئے جانور کی پشت کو پانی سے صاف کریں۔

اگر جانور بیٹھا ہوا ہو تو اسے سایہ، تازہ پانی اور خوراک مہیا کریں۔

- ایک کپ پانی میں دو چمچ چینی، ایک چمک نمک اور ایک چمک میٹھا کھانے کا سوڈا (بیکنگ سوڈا)

اگر پچش برقرار رہے تو جانوروں کے معالج سے رجوع کریں۔

انفیکشن کے عوامل (خطرات)	علاج	عام وجہ (سبب)	پچش کی نوعیت	شاک کلاس (درجہ)
<ul style="list-style-type: none"> • جانوروں کو نامسا ند گندے ماحول میں رکھنا۔ • باڑوں کی باقاعدہ صفائی نہ کرنا۔ • تنگ جگہ پر جانوروں کو رکھنا۔ • بڑے اور چھوٹے جانوروں کو اکٹھے رکھنا۔ 	<p>سکور-X لیکویڈ یا ملتی جلتی 12 ملی لیٹر فی دس کلو زندہ وزن کے حساب سے دن میں دو بار تین دن کیلئے۔</p>	<p>بیکٹیریا / کوکسیڈیا کی آنتوں کی انفیکشن</p>	<p>پانی کی طرح پتلا، بدبودار، سبزی مائل</p>	<p>گھروں میں رکھے مینے</p>
<ul style="list-style-type: none"> • چھوٹی گھاس پر چرائی • علاقے جہاں جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہو • ایسی چراگاہ پر چرائی جہاں پہلے پچش زدہ جانوروں نے چرائی کی ہو 	<p>آئیورمیکٹن 1% Ivermectin زیر جلد انجیکشن بکری: 0.4 ملی لیٹر بھیڑ: 0.2 ملی لیٹر لیو امیسول (پلانے کیلئے) بکری: 1.5 ملی لیٹر بھیڑ: 1.0 ملی لیٹر الہینڈازول (پلانے کیلئے) بکری: 4 ملی لیٹر بھیڑ: 2 ملی لیٹر</p>	<p>طفیلی کیڑے</p>	<p>پتلا سیاہی مائل لیکن زیادہ بدبودار نہیں</p>	<p>چرنے والے مینے / بڑے جانور</p>

ایک کا انتخاب کریں۔ تمام خوراکیں 10 کلو جانور کے وزن کے حساب سے ہیں۔

طفیلی کش ادویات پلائیں یا ایک دفعہ حسب ضرورت بذریعہ انجیکشن