



# حفاظتي ٺڪا (ويڪسينيشن)

## تعارف


هڪ چوڻي آهي ته ”روڪڻام ڪرڻ علاج کان بهتر آهي“. انهي جو مطلب اهو آهي ته بيماري جي علاج تي وڌيڪ پئسا ضايع ڪرڻ کان سنو آهي ته اسان هڪ ننڍي ڳالهه تي عمل ڪري بيمارين کان جانورن کي بچايون جنهن تي تمام گهٽ پئسا خرچ ٿيندا. هيٺئر توهان کي حفاظتي ٺڪا لڳائڻ تي رڳو ڪجهه پئسا لڳائڻا پوندا پر بيماري جي صورت ۾ اوهان کي وڌيڪ رقم خرچ ڪرڻي پوندي. انهي جي ڪري حفاظتي ٺڪن لاءِ اها ننڍي رقم نه صرف جانور جي حفاظت ڪندي پر اوهان جي ڪاروبار ۾ وڌيڪ فائدو پهچائيندي.

## حفاظتي ٺڪا (ويڪسينيشن) ڇا آهي؟



ليباريٽري ۾ ڪنهن خاص بيماري جي جراثيم کي ڪمزور يا ماري ڪري ويڪسين ٺاهي ويندي آهي. اهي جراثيم جڏهن جانورن کي سڙي يا انجڪشن جي صورت ۾ لڳائبا آهن ته اهي ڪا خاص بيماري پيدا نه ڪندا آهن. پر جانور جي جسم ۾ ان جي موجودگي فطري عمل (قوتِ مدافعت) کي وڌائڻ شروع ڪندي آهي. ۽ پوءِ اگر ساڳي بيماري جانورن تي حملو ڪري ٿي ته جانور ۾ پهريان ئي ان بيماري سان وڙهڻ لاءِ مضبوط دفاعي قوت موجود هوندي آهي. انهيءَ طرح ويڪسينيشن جانورن کي انهيءَ بيماري کان بچائيندي آهي.

## ويڪسين يا حفاظتي ٺڪا ڪٿان حاصل ٿي سگهن ٿا؟



ڀاڳيا پنهنجي جانورن کي ويجهي علائقائي جانورن جي اسپتال يا ڊسپينسري تي رجسٽرڊ ڪرائين. جيڪي حڪومتي پاليسي جي مطابق حفاظتي ٺڪا لڳائيندا آهن يا وري پنهنجي طريقي سان خانگي / پرائيوٽ ويڪسين خريد ڪري يا لڳرائي سگهن ٿا.

## ويڪسين کي استعمال ڪرڻ جا احتياط



- هميشه نالي وارين ڪمپنين يا سرڪاري ادارن جيئن ”وٽرنري ريسرچ انسٽيٽيوٽ“ پاران تيار ڪيل ويڪسينس استعمال ڪندا ڪريو.
- ويڪسين کي ڪنهن ريفريجريٽر يا برف مان پيريل ٿرماس ۾ ڍڪي / اسٽور ڪريو. ڇو جو گرمي پد جي وڌڻ سان ويڪسين جي تاثير ۾ گهٽتائي اچي سگهي ٿي.
- استعمال کان پهريان شيشي/بوتل کي سني طرح لوڏايو يا ملايو.

- بيمار جانورن کي ويڪسين هرگز نه لڳرايو.
- جانورن جي ڊاڪٽر جي مشوري يا ويڪسين تي لکيل هدايتن مطابق هر جانور کي صحيح مقدار ۾ ويڪسين لڳرايو.
- جانورن کي صبح سوڀري يا شام جو ٺڪا لڳرائجن جنهن محل موسم ٿڌو هجي.
- پُسيل يا خراب جانورن کي ٺڪا نه لڳرايو ته ڇمڙي ۾ انفیکشن ٿيڻ جو خطرو ٿي سگهي ٿو.
- ڪجهه ويڪسين سٺي لڳڻ واري جاء تي سوچ جو سبب بڻجن ٿيون، جيڪا آهستي آهستي گهٽ ٿيندي آهي ۽ ڪجهه عرصي کانپوءِ ختم ٿي ويندي آهي.

## رڍن ۽ ٻڪرين جي بيمارين کان بچاءَ لاءِ حفاظتي ٺڪن جو چارٽ

- مختلف ويڪسين سال جي مختلف وقتن يا عرصي ۾ لڳائي ويندي آهي.
- هيٺ ڏنل هدايتون هڪ عام معلومات جو مجموعو آهي. هميشه اهم هدايتن تي عمل ڪريو جيڪي ويڪسين سان گڏ اچن ٿيون يا مقامي حالتن جي مطابق مشورن تي عمل ڪجي.
- رڍن ۽ ٻڪرين کي ڪڏهن ڪڏهن ”ڪاري جنگهه“ بليڪ ڪواٽر (بي ڪيو) جا حفاظتي ٺڪا لڳائي سگهجن ٿا.
- حفاظتي ٺڪن جي وڌيڪ معلومات جهڙوڪ ”ساماڙو، ڪاٽا، پليورونمونيا جهڙيون بين بيمارين جون پراجيڪٽ وٽ اهڙيون معلوماتي شيٽون پڻ موجود آهن

حفاظتي ٺڪا	لڳائڻ جو وقت يا عرصو
رتوان دست (Enterotoxaemia) اٿنٽريڪس يا پرڪي يا ڪارو واڙ (Anthrax) مهاڙو يا ساماڙو (FMD) ٻڪرين جي ماتا (Goat Pox)	هر ڇهن مهينن کان پوءِ ٻيهر لڳرايو.
ڪاٽا (Peste des petits ruminants (PPR))	مارچ، اپريل ۾ بيماري جي وڌڻ کان پهرين فيبروري ۾ ٺڪا لڳرائي ڇڏجن.
ڦڦڙي يا پليورونمونيا (Contagious caprinepleuropneumonia (CCPP))	جنوري، فيبروري ۾ بيماري جي وڌڻ کان پهرين نومبر يا ڊسمبر ۾ ٺڪا لڳرائي ڇڏجن.

