



حکومت سندھ
Government of Sindh




**What farmers need:
Access to services & knowledge**


Constraints reported by Punjab & Sindh SR households



Future training requested by farmers




Constraints reported by VOs & VAs



Zoonotic disease survey

“We have been using raw milk since years and it has no harm on human health. It is full of nutrition and healthy”

“We work with animals even we have cuts/bruises on hands and we don't have any bad experience yet. There is no risk of any disease, even working with cuts on hand”



علامات



انسانوں میں

- زون کا نام جس کی علامات
- تھوڑے سردی
- جسمانی کمزوری
- جڑوں اور پٹوں کا درد
- ذہن میں کمی، بھوک میں کمی
- خاص طور پر جلد لاشی اور جھولے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
- برہکت خارج نہ کرنا، پھانسی کا خاص اور آسان کا سبب بن سکتا ہے۔



بکریوں اور گھروں میں

- پنی کمزوری
- سوتھے سے سوتھے
- سوتھے سے سوتھے (شازہ دار)



بھیڑ بکریوں میں

- آخری لام میں استھ کا دل
- سردی چالوں میں کمی
- کوزہ لانا کیونکہ
- چھانٹنے کی سوزش

بچاؤ

شہری ہے کہ ایسے مقامات جہاں وہ اپنی کاروبار دیکھ رہا ہے وہاں
طاقتی اقدامات لیا جائے گا۔



گوشت کو اچھی طرح پکا کر کھا جائے۔



ذہری لاشی پینے اور پھینک دینے سے بچنا ہے
وہاں وہاں کا استعمال کریں۔



برہکت سے متاثرہ جانوروں کو سنبھالنے والے
طاقتی اقدامات کا استعمال ضرور کریں۔



جانوروں کو طاقتی دیکھ جانتا کا
کوتی کرنا ہے۔

پیش



1

فضلہ نرم ہو جاتا ہے۔

2

فضلہ پتلا، پانی کی طرح پالیس دار
رطوبت کی طرح ہو جاتا ہے

3

شدید پیش کی صورت میں
فضلہ ٹوٹی بھی ہو جاتا ہے۔

علامات

اگر چہ سرسبز چارہ کھانے سے بھی فضلہ عموماً نرم ہو جاتا ہے۔
لیکن پیش کی صورت میں یہ علامات دیکھی جاسکتی ہیں۔



- وزن میں کمی
- بھوک میں کمی
- سستی اور دباؤ کی کیفیت
- بخار

وجوہات



** طفیلی کیڑوں کی وجہ سے انگلیں



• جراثیم کی وجہ سے انگلیں *



خوراک کے معمول میں اچانک تبدیلی
بشمول سرسبز شاہب چارہ یا نشاستہ دار خوراک
جیسا کہ گندم اور جو کا ایک دم اضافہ کر دینا۔



کچھ پودے کھانے کی وجہ سے
پیش لاحق ہو سکتی ہے۔

بچاؤ


- دھیرے دھیرے ہشت بھر میں سے نئی
- خوراک متعارف کروائیں۔ نشاستہ دار
- خوراک جیسا کہ گندم بعد میں
- متعارف کروائیں۔



اچھی قوت مدافعت کیلئے نوازنیہ مکھن کو
کلوٹرم (یونی) پلائیں

پیش زدہ بھیڑ اور بکریوں کو باقی رہیڑ سے علیحدہ رکھیں۔
پیارے مینوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ علیحدہ رکھیں۔

ماحول اور بازو کو صاف ستھرا رکھیں۔
پیار جانوروں کی دیکھ بال اور علاج
کے بعد ہاتھ پاؤں اور جوتوں کو
اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔



* انگلیں: حادی، بانی مرض جو جراثیم طفیلی کیڑوں وغیرہ سے پھیلتی ہے۔
** طفیلی: ایسے وہ مگرمکرمے وغیرہ حیوانی خوراک اور پھانسی کے دوسروں پر چھانکرتے ہیں۔

Pictorial factsheets were developed for female farmers unable to read: treatment and prevention of different zoonotic (Brucellosis) and management (diarrhea) disorders

In post-trial workshops, farmers expressed acute need for linkages with livestock departments and veterinarians:

“It was for the first time that some member from livestock department is in direct contact with us and supporting us in rearing small ruminants”

(Farmer, male)

“I am very happy that a local veterinarian has welcomed us at dispensary at any time and he will give treatment and vaccination services to our animals free of cost”

(Farmer, female)



Members of livestock departments addressing farmers

Key messages:

Farmers are hungry for knowledge, information, and technical advice



There is a dire need for industries to collaborate with other organizations to support better productivity and profitability for farmers

Thank You



حکومت سندھ
Government of Sindh

